Lebertherapeutika

Nur für Fachpersonen bestimmt.

Fachreferentin ebi-pharm ag: Karin Klups

eidg. dipl. Apothekerin, Verantwortliche Medizin

SEBIM 12. Jahrestagung, Samstag, 20. März 2021

Die Lebermittel

- Anwendungsgebiete:
  - Anregung der Leberfunktion
  - Ausleitung und Entgiftung über die Leber
  - Störungen des Gallenflusses
  - Verdauungsbeschwerden
  - Mangelnde Fettverdauung
  - Appetitlosigkeit

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären. Deshalb soll das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Abklärung angewendet werden.

Ayurvedische Heilmittel
Eigenschaften

- Pflanzenmischungen
- Mineralischer Anteil (Bhasma)
- Jahrtausendealte Vorschriften
- Traditionelles, spezifisches Herstellungsverfahren
- Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Körper, Geist und Seele

Liv.52
Zusammensetzung

1 Tablette enthält Pulver aus:

Capparis spinosa	65 mg
Cichorium intybus	65 mg
Solanum nigrum	32 mg
Terminalia arjuna	32 mg
Cassia occidentalis	16 mg
Achillea millefolium	16 mg
Tamarix gallica	16 mg
Ferrum bhasma	33 mg
excip. pro compr.	

Liv.52
Indikationen

- Funktionelle Störungen im Rahmen von Lebererkrankungen wie **Völlegefühl, Blähungen**
- Appetitlosigkeit z.B. in der Rekonvaleszenz und bei Chemotherapie

Liv.52
Dosierung und Anwendung

- Dosierung: 3x täglich 2-4 Tabletten
- Einnahme vor den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit, unzerkaut

- NW: in seltenen Fällen erhöhte Stuhlfrequenz
- KI: Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren, Hämochromatose (Eisenspeicherkrankheit)

Studien/Untersuchungen

1. Liv.52 regulates ethanol induced PPARgamma and TNF alpha expression in HepG2 cells.
   Mitra SK, Varma SR, Godavarthi A, Nandakumar KS.
   Mol Cell Biochem. 2008 Aug;315(1-2):9-15. doi: 10.1007/s11010-008-9782-9. Epub 2008 May 1.
   PMID: 18449625
   Similar articles

2. Liv.52 protects HepG2 cells from oxidative damage induced by tert-butyl hydroperoxide.
   Vidyashankar S, K Mitra S, Nandakumar KS.
   Mol Cell Biochem. 2010 Jan;333(1-2):41-8. doi: 10.1007/s11010-009-0202-6. Epub 2009 Jul 22.
   PMID: 19629649
   Similar articles

3. Liv.52 attenuate copper induced toxicity by inhibiting glutathione depletion and increased antioxidant enzyme activity in HepG2 cells.
   Vidyashankar S, Patki PS.
   Food Chem Toxicol. 2010 Jul;48(7):1863-8. doi: 10.1016/j.fct.2010.04.024. Epub 2010 Apr 20.
   PMID: 20412827
   Similar articles

4. Effect of Liv.52, a herbal preparation, on absorption and metabolism of ethanol in humans.
   Chauhan BL, Kulkarni RD.
   Eur J Clin Pharmacol. 1991;40(2):189-91.
   PMID: 2065700
   Similar articles

5. Protective effect of Liv.52 on alcohol-induced fetotoxicity.
   Gopumadhavan S, Jagadeesh S, Chauhan BL, Kulkarni RD.
   Alcohol Clin Exp Res. 1993 Oct;17(5):1089-92.
   PMID: 8279671
   Similar articles

Ceres
Taraxacum comp. Leber Galle Tropfen

- Zusammensetzung
  - Taraxacum Ø (Löwenzahn-Urtinktur)
  - Carduus marianus Ø (Mariendistel-Urtinktur)
  - Chelidonium D4 Dil. (Schöllkraut- Urtinktur)
- Dosierung: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 1–3-mal täglich 2–5 Tropfen

Ceres
Taraxacum comp. Leber Galle Tropfen

- Indikationen:
  - Funktionellen Beschwerden im Bereich der Leber Galle
  - Leber-Galle Beschwerden mit Übelkeit
  - Blähungen mit Aufstossen
  - Empfindlichkeit gegen Einengung am Bauch (z.B. Gürtel)
- Kontraindikationen
  - bei Verschluss der Gallenwege, Gallensteinleiden, Gallenblasenemphysem und Darmverschluss.
  - Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren sind ärztlich abzuklären.

Übersicht Leberpflanzen



apo-HEPAT®

Homöopathisch - spagyrische Tropfen

- Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Verdauungsbeschwerden infolge Leber- und Gallenfunktionsstörungen wie Appetitlosigkeit, Blähungen, Aufstossen
- Dosierung
  - Erwachsene: 3 mal 10 - 15 Tropfen
  - Kinder ab 12 Jahren: 3 mal 7 - 10 Tropfen,
  - täglich in etwas Flüssigkeit jeweils nach den Mahlzeiten einnehmen
- Abgabekategorie D

apo-HEPAT®

Homöopathisch - spagyrische Tropfen

- Zusammensetzung 1 g Lösung enthält: Peumus boldus spag. PEKA TM 60 mg; Cynara scolymus TM 100 mg; Chionanthus virginicus D2 140 mg; Iberis amara D6 140 mg; Lycopodium clavatum D4 140 mg; Mandragora e radice siccata spag. PEKA D4 140 mg; Phosphorus D10 140 mg; Taraxacum officinale spag. PEKA TM 140 mg; enthält 34 Vol-% Alkohol
- Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind bisher keine Nebenwirkungen beobachtet worden
- Eine Erstverschlimmerung ist möglich

apo-HEPAT®

Homöopathisch - spagyrische Tropfen



apo-HEPAT®

Homöopathisch - spagyrische Tropfen

- Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll apo-Hepat®, Tropfen in diesen Fällen ohne ärztliche Verschreibung nicht angewendet werden.
- Bei schweren Leberstörungen (Verschluss der Gallenwege) darf apo-Hepat®, Tropfen nicht ohne ärztliche Beratung angewendet werden

Topische Anwendung von Frischpflanzentüchlein **Schafgarbe** (Achillea millefolium)

- Verwendung:
  - Unterstützt das Leber-Galle-System
- Phytotherapie:
  - Bitterstoffe, ätherische Öle
  - Dyspeptische Beschwerden
  - Leber: hepatoprotektiv, bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen
  - Galle: choleretisch & cholekinetisch
  - Entzündung der Magen- & Darmschleimhaut

(Bäumler, 2007: 359-360)

Zusammenfassung

VIELEN DANK

UND BIS BALD WIEDER

ebi-pharm

Hinweise

- Arzneimittel zur Individualtherapie ohne Indikation und Dosierungsempfehlung sind im Rahmen einer Individualtherapie gemäss Vorgabe der abzugebenden Fachperson zur Empfehlung vorgesehen. Die Angaben zu Anwendungsgebiet und Dosierung basieren auf den entsprechenden homöopathischen Arzneimittelbildern gemäss nachstehender Fachliteratur.
- Für weitere Informationen bei Arzneimittel verweisen wir auf die Packungsbeilage oder www.swissmedicinfo.ch

Zulassungsinhaberinnen

- Ceres: Ceres Heilmittel AG, Kesswil
- Liv. 52, Pekana apo-hepat: ebi-pharm ag, Kirchlindach